راهنمای آموکسی‌سیلین — دوره کامل و ساعت‌بندی

پرتجویزترین آنتی‌بیوتیک ایران — این برگه کنار جعبه دارو بماند

بخش ۱ — قواعد طلایی مصرف

- [ ] آموکسی‌سیلین فقط برای عفونت باکتریایی است؛ سرماخوردگی و آنفولانزا (ویروسی) با آن درمان نمی‌شود
- [ ] دوز رایج بزرگسال ۵۰۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت یا ۸۷۵ هر ۱۲ ساعت است — طبق نسخه پزشک
- [ ] دوره را کامل ببرید؛ قطع زودهنگام بعد از بهبود = برگشت عفونت و مقاومت باکتری
- [ ] با یا بدون غذا مجاز است؛ با غذا تهوع را کم می‌کند
- [ ] ساعت‌ها را منظم نگه دارید (۸ صبح / ۴ عصر / ۱۲ شب نمونه)
- [ ] فراموشی: به‌محض یادآوری مصرف؛ نزدیک دوز بعدی، آن دوز را رد کنید و دوبل نکنید
- [ ] مصرف خودسرانه، قرض گرفتن از دیگران و باقی‌مانده دوره‌های قبلی ممنوع

بخش ۲ — جدول برندهای رایج بازار

برند	شرکت/فرم	دوزها	نکته
آموکسی‌سیلین ۵۰۰	داروسازی کوثر — کپسول	۲۵۰/۵۰۰	خط تاریخی آنتی‌بیوتیک (لیانس بیچام)
آموراکس	تولید داخل — کپسول/سوسپانسیون	۵۰۰	ژنریک رایج
ایراموکس	تولید داخل — کپسول/سوسپانسیون	۲۵۰/۵۰۰	فرم شربت برای کودک
فاراموکس / آموکسیل	تولید داخل	۵۰۰	ژنریک بازار

هشدار آلرژی پنی‌سیلین: کهیر منتشر، تورم لب/صورت، خس‌خس یا تنگی نفس بعد از مصرف — فوراً قطع و اورژانس؛ این سابقه را برای همه پزشکان/پرستارها بگویید. اسهال خفیف شایع است؛ اسهال شدید آبکی یا خونی = قطع و مراجعه. با آلوپورینول و متوترکسات تداخل دارد — لیست داروها را نشان دهید.

نکته سالمندی: آموکسی‌سیلین با وارفارین اثر ضدلخته را بالا می‌برد؛ اگر سالمند وارفارین دارد، بعد از شروع آنتی‌بیوتیک INR زودتر چک شود. برای منظم‌ماندن دوره، تقویم دارویی هفتگی را پرستار می‌چیند.

مشاوره خرید آموکسی‌سیلین و پرستاری در منزل — کرج و البرز

0764 767 0912

hilahealth.com — فرم ثبت درخواست آنلاین در سایت