راهنمای سفیکسیم – قرص و شربت کودک

سفالوسپورین نسل سوم برای عفونت ادراری/گلو/گوش – دوز وزن‌محور

بخش ۱ – قواعد طلایی

- [ ] دوز رایج کودک ۸ میلی‌گرم/کیلوگرم روزانه (یک‌بار یا نصف صبح و شب) – فقط طبق نسخه
- [ ] سوسپانسیون را با آب جوشیده خنک طبق بروشور مخلوط کنید و در یخچال نگه دارید؛ حداکثر ۱۴ روز
- [ ] با لیوان/سرنگ اندازه‌گیری داده‌شده بدهید؛ قاشق غذاخوری خانه اندازه دقیق ندارد
- [ ] قبل از هر بار مصرف، شیشه را خوب تکان بدهید
- [ ] بعد از بهبود ظاهری هم دوره را کامل ببرید (معمولاً ۵-۱۴ روز طبق نسخه)
- [ ] سابقه حساسیت به سفالوسپورین یا پنی‌سیلین را حتماً بگویید

بخش ۲ – برندها و فرم‌های بازار

برند	شرکت	فرم	نکته
سفیکسیم ۲۰۰/۴۰۰	فارابی دارو	قرص ۲۰۰/۴۰۰	ژنریک رایج بزرگسال
سفیکسیم	داروسازی کوثر و تولید داخل	قرص/سوسپانسیون	خط آنتی‌بیوتیک قدیمی
شربت سفیکسیم ۱۰۰/۵	تولید داخل	سوسپانسیون	دوز وزن‌محور کودک

هشدارها: اسهال شایع‌ترین عارضه است؛ نوشیدن مایعات کافی و ادامه دوره معمولاً کافی است ولی اسهال شدید/خونی = قطع و مراجعه. کهیر، تورم صورت، خس‌خس = اورژانس. با آنتی‌اسید/سوکرفالت ۲ ساعت فاصله. در نارسایی کلیه دوز تغییر می‌کند.

نکته خانواده: عفونت ادراری مکرر در کودک/سالمند نیاز به پیگیری دارد – تست ادرار بعد از اتمام دوره را فراموش نکنید. اگر کودک استفراغ کرد تا ۱۵ دقیقه بعد، دوز را تکرار نکنید و دفعه بعد با غذا بدهید و به پزشک خبر دهید.

مشاوره خرید سفیکسیم و مراقبت کودک و سالمند در منزل – کرج و البرز

0764 767 0912

hilahealth.com – فرم ثبت درخواست آنلاین در سایت