راهنمای مترونیدازول — قواعد طلایی و جدول تداخل

عفونت بی‌هوازی، دندان و انگل — «الکل مطلقاً ممنوع»

بخش ۱ — قواعد طلایی

- ☐ با غذا بخورید تا تهوع و طعم فلزی کم شود؛ طعم فلزی دهان با دوره تمام می‌شود
- ☐ دوزهای رایج: ۲۵۰/۵۰۰ میلی‌گرم هر ۸ ساعت (طبق نسخه)؛ دوره آمیبیازیس ۵ تا ۱۰ روز
- ☐ الکل و حتی دهان‌شویه‌های الکل‌دار تا ۴۸-۷۲ ساعت بعد از آخرین دوز مطلقاً ممنوع (واکنش دیسولفیرام‌مانند: استفراغ، تپش شدید، افت فشار)
- ☐ قرص را نصف/خرد نکنید مگر فرم آره‌دار داشته باشد؛ رهایش طولانی‌اثر در بازار ایران کم است ولی چک کنید
- ☐ ادرار تیره/قرمز-قهوه‌ای طبیعی و بی‌خطر است — نگران نشوید
- ☐ دوره کامل شود؛ ترک نیمه‌کاره = برگشت عفونت

بخش ۲ — برندهای رایج بازار

برند	شرکت	فرم/دوز	نکته
فلاژیل (Flagyl)	سانوفی — واردات	قرص ۲۵۰ / ویال	برند مرجع جهانی؛ موجودی متغیر
مترونیدازول ابن‌حیان	جابر بن حیان	قرص ۲۵۰	ژنریک رایج
مترونیدازول ۲۵۰/۵۰۰	تولید داخل (داروپخش/سایر)	قرص	ژنریک بازار
ژل/پماد مترونیدازول	تولید داخل	پوستی	آکنه/زخم؛ فقط موضعی

بخش ۳ — جدول ساعت مصرف و ممنوعه‌ها

ساعت نمونه	مجاز	ممنوع/فاصله
۸ صبح / ۴ عصر / ۱۲ شب	قرص با غذا و آب	الکل در هر فرم — تا ۳ روز بعد از آخرین دوز
در طول دوره	مایعات کافی	دهان‌شویه الکل‌دار؛ رانندگی در صورت گیجی
با وارفارین	ادامه طبق نسخه	INR بالا می‌رود — آزمایش زودتر؛ با لیست داروها مشورت

علائم هشدار: گزگز شدید دست/پا (نوروپاتی)، تشنج، تاری دید شدید — قطع و فوراً پزشک. در بارداری سه‌ماهه اول و شیردهی فقط با نظر پزشک. مصرف در سالمند با وارفارین/فنی‌توئین/لیتیوم نیاز به پایش دارد — لیست داروها را نشان دهید.

مشاوره خرید مترونیدازول/فلاژیل و مراقبت عفونت در منزل — کرج و البرز

0764 767 0912

hilahealth.com — فرم ثبت درخواست آنلاین در سایت